

## アセノベル徐放錠 500mg

### 【この薬は？】

販売名	アセノベル徐放錠 500mg Acenobel Extended Release Tablets 500mg
一般名	アセノイラミン酸 Aceneuramic Acid
含有量 (1錠中)	500mg

### 患者向医薬品ガイドについて

**患者向医薬品ガイド**は、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」  
<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

### 【この薬の効果は？】

- ・この薬は、縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー治療剤と呼ばれる薬です。
- ・この薬は、不足しているシアル酸を補充することによって筋力低下の進行を遅らせます。
- ・次の病気の人に処方されます。  
**縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチーにおける筋力低下の進行抑制**
- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると病気が悪化することがあります。医師の指示どおりに飲み続けることが重要です。

## 【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
  - ・過去にアセノベル徐放錠に含まれる成分で過敏症のあった人
- 次の人は、特に注意が必要です。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
  - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
  - ・授乳中の人

## 【この薬の使い方は？】

### ●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などに合わせて、医師が決めます。  
通常、成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

一回量	4錠
飲む回数	1日3回食後 次の使用まで約8時間空けて下さい。

### ●どのように飲むか？

コップ1杯程度の水またはぬるま湯で、この薬はかまわずに飲んでください。  
飲みにくい場合は、多めの水で1錠ずつ飲んでください。

### ●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次の飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分飲んでください。

### ●多く使用した時（過量使用時）の対応

異常を感じたら、医師または薬剤師に相談してください。

## 【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳している人は医師に相談してください。

## 副作用は？




特にご注意いただきたい副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。  
このような場合には、できるだけ早く医師または薬剤師に相談してください。

副作用	主な自覚症状
肝機能障害 かんきのうしょうがい	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、吐き気、 食欲不振

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。  
これらの症状に気づいたら、副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	疲れやすい、体がだるい、力が入らない、食欲不振
口や喉	吐き気

## 【この薬の形は？】

性状	白色～微黄白色の楕円形の徐放錠	
形状	表面  裏面  側面 	
大きさ	長径	19.0 mm
	短径	9.5 mm
	厚さ	8.1 mm
	重量	1200mg

## 【この薬に含まれているのは？】

有効成分	アセノイラミン酸
添加剤	アルギン酸ナトリウム、カラギーナン、ケイ酸処理結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース

## 【その他】

### ● この薬の保管方法は？

- ・ 直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・ ボトル開封後は使用するたびにふたをしっかりと閉め、保管してください。
- ・ 子供の手の届かないところに保管してください。

### ● 薬が残ってしまったら？

- ・ 絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・ 余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

## 【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・ 症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・ 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：ノーベルファーマ株式会社

(<https://www.nobelpharma.co.jp>)

カスタマーセンター

電話：0120-003-140

受付時間：9時～18時

（土、日、祝日および当社休日を除く）